

Guía de preparación de Spevigo® (espesolimab) para los brotes de psoriasis pustulosa generalizada (PPG)



Escanea el QR o clica el link para acceder a la ficha técnica de **espesolimab**.

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1221688001/FT_1221688001.html



Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas adversas asociadas a este medicamento.

Spevigo 450 mg concentrado para solución para perfusión, 2 viales de 7,5 ml, PVP IVA: 20.130,15€. Con receta médica. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Medicamento de uso hospitalario.



Presentación del medicamento (espesolimab):



1 caja con **2 viales** que contienen **450mg de espesolimab** cada uno. Cada vial contiene **7,5ml** a una concentración de 60mg/ml.



Durante su **almacenamiento**, los viales deben mantenerse en su embalaje original a una temperatura de **2-8°C**. No congelar.

Instrucciones para la preparación de Spevigo® antes de la administración al paciente¹:



La preparación de la medicación debe hacerse en condiciones **asépticas**. Para más información, consultar ficha técnica¹.

1

Preparación del material



Jeringas estériles de un solo uso



Sistema de perfusión



Agujas



Viales de espesolimab (2 x 7,5ml)



Bolsa para perfusión de 100ml de capacidad con: Cloruro sódico 0,9% o vacía




Inspeccionar visualmente el vial antes de su uso. Si la solución está turbia, ha cambiado de color o contiene partículas grandes o de color, desechar el vial.

2a

Preparación de la medicación: dilución en bolsa de perfusión con 100ml de solución salina 0,9%

- 1 A partir de la bolsa con 100ml de solución salina 0,9%, extraer con una jeringa 15ml y descartar la jeringa
- 2 Con una nueva jeringa, extraer 15ml de la solución de espesolimab





Descartar 15ml



Coger 15ml

- 4 Conectar la bolsa con el sistema de perfusión
- 3 Añadir los 15ml de solución de espesolimab a la bolsa de suero (85ml solución salina 0,9%)



Medicación lista para ser administrada al paciente con la mayor brevedad posible.



Una vez preparada la medicación, es estable durante 24h a una temperatura de 2-30°C. No congelar. Conservar fuera de la luz en condiciones asépticas.

2b

Preparación de la medicación: dilución en bolsa de perfusión vacía

- 1 Añadir 85ml de solución salina 0,9% en la bolsa de perfusión vacía
- 2 Con una nueva jeringa, extraer 15ml de la solución de espesolimab




Añadir 85ml



Coger 15ml

- 4 Conectar la bolsa con el sistema de perfusión
- 3 Añadir los 15ml de solución de espesolimab a la bolsa de suero (85ml solución salina 0,9%)



Medicación lista para ser administrada al paciente con la mayor brevedad posible.



Una vez preparada la medicación, es estable durante 24h a una temperatura de 2-30°C. No congelar. Conservar fuera de la luz en condiciones asépticas.

PPG: psoriasis pustulosa generalizada

1. Ficha técnica: Spevigo®. https://cima.aemps.es/cima/dohtml/ft/1221688001/FT_1221688001.html.