Epidemiología y distribución espacial de la psoriasis pustulosa generalizada en España: un análisis poblacional a nivel nacional basado en datos de ingresos hospitalarios (2016-2020)

Trinidad Montero-Vílch[1], Mercè Grau-Pérez[2], Carlos Cuenca-Barrales[1], Ignacio García-Doval[2]
[1]Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada.
[2]Unidad de investigación Fundación Piel Sana Academia Española de Dermatología y Venereología.

Antecedentes

La **psoriasis pustulosa generalizada** (PPG) es una enfermedad rara y potencialmente mortal que con frecuencia requiere ingreso hospitalario. En la actualidad, los conocimientos sobre su **epidemiología** y etiopatogenia son limitados.

Objetivos

Describir los casos hospitalizados de PPG en España y evaluar su distribución espacial en todo el país.

Material y métodos

- Diseño: Estudio transversal.
- Población: Pacientes con diagnóstico de GPP o con diagnóstico principal de otras formas de psoriasis al alta hospitalaria.
- Fuente de información: Base de Datos Nacional de Altas Hospitalarias (Conjunto mínimo básico de datos, CMBD).
- Criterios de elegibilidad. Codificación del diagnóstico de psoriasis basada en la 10º revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades

	Enfermedad	Código CIE-10
Incluidos	Psoriasis pustulosa generalizada	L40.1 Psoriasis pustulosa generalizada
	Psoriasis en placa	L40.0 Psoriasis vulgar
	Acrodermatitis continua de Hallopeau	L40.2 Acrodermatitis continua
	Psoriasis pustulosa palmoplantar	L40.3 Pustulosis palmar y pantar
	Psoriasis en gotas	L40.4 Psoriasis guttata
	Otras fromas de psoriasis	L40.8 Otros tipos de psoriasis L40.9 Psoriasis, no especificada
Excluidos	Psoriasis artropática	L40.5 Artropatia psoriásica

Resultadors N=1.693

744 PPG vs 949 otras formas de psoriasis

Características sociodemográficas

- PPG > edad (62,23 vs 58,03)
- PPG > necesidad de UCI (6,1% vs 1,4%)
- PPG > mortalidad (4,8% vs 1,5%)
- PPG > número de reingresos (23,3% vs 16%)

Tasa de hospitalización por PPG:

3,18 casos por 1.000.000 personas-año.

Mayor incidencia en el noroeste del país.

(I=0,20, p=0,012)



Conclusión

La tasa de hospitalización por PPG es heterogénea en España, reforzando la posible existencia de factores de riesgo genéticos o ambientales con una distribución geográfica desigual.

Este trabajo forma parte de la Beca "Juan de Azúa", beca de colaboración con la Unidad de Investigación de la Academia Española de Dermatología otorgada por la Fundación Piel Sana en la Academia Española de Dermatología y Venereología en diciembre de 2021 en el 48 congreso Nacional de Dermatología y Venereología.

49 CONGRESO NACIONAL DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA
AEDV 2022
MÁLAGA & ONLINE 1/4 JUNIO
Impresión del póster por cortesía de: